

Agosto 2021

Nuevas recomendaciones para rastreo de funcionarios o pacientes en contacto con casos positivos de COVID19

Importante: es responsabilidad de cada servicio realizar el rastreo de sus funcionarios y/o pacientes ante un caso positivo de COVID 19

1. Identificación de contactos:

Las variables a tener en cuenta son :

- tiempo de exposición: mayor a 15 minutos
- uso de EPP estándar según el riesgo de exposición
- si participó en procedimientos generadores de aerosoles: uso de N 95 y protección facial
- distanciamiento: mayor o menor a 2 metros
- ventilación del espacio
- presencia de síntomas respiratorios del caso o el contacto
- estado de inmunización frente a SARS-COV2

2. Medidas:

a. Funcionarios /estudiantes

- En caso de que constituya contacto de un caso positivo: si se trata de vacunados con pfizer, continúa concurriendo a las actividades como habitualmente y se realiza PCR entre el 5° y 7° día del último contacto con el caso.
Si presenta síntomas debe realizarse PCR en el momento de inicio de los mismos.

Si se trata de vacunados con sinovac u otras plataformas diferentes a las de ARNm se indica cuarentena y realización de PCR entre el 5° y 7° día del último contacto con el caso o si presenta síntomas, inmediatamente después de su inicio.

En caso de vacunados con sinovac y tercera dosis de pfizer se procederá igual que en el caso de los vacunados con pfizer.

- La coordinación del hisopado para los funcionarios se realizará en oficina de citas (int. 4676). En caso de estudiantes deberá realizarse en su prestador.
- Los jefes de servicio deben enviar una planilla que incluya servicio, nombre y cédula del caso y listado de contactos con nombre, cédula, teléfono, fecha de último contacto, estado vacunal y medidas adoptadas
Esta planilla se reporta vía mail al Comité de Infecciones del HC ihospnc@gmail.com

b. Pacientes

Las personas que constituyan contacto deben cumplir aislamiento y realizarse un PCR entre el 5° y 7° día del último contacto con el caso o antes si presenta síntomas.

Es importante identificar la fuente del caso para conocer si es intrahospitalaria o comunitaria.

Dirección- Comité de Prevención y Control de Infecciones

