


SALA DE INTERNACIÓN PARA PACIENTE CON COVID19

Para la atención de los pacientes se aplican las precauciones estándar y se le agregan las basadas en la vía de *TRASMISIÓN* por *GOTITAS Y CONTACTO*, en caso de *injuria de la vía aérea* las precauciones son *AÉREAS*.


HIGIENE DE MANOS: antes y después del contacto con el paciente, su entorno, y después de retirarse las EPP.



- **TAPABOCA COMÚN:** Personal de salud: colocar al entrar a la habitación cubriendo correctamente nariz y boca. Atar en el medio de la cabeza y en el cuello. Adaptar la pieza flexible a la nariz. El paciente debe tener el tapabocas puesto ante la presencia de cualquier persona



- **TAPABOCA N95 o Alta densidad:** Utilizar siempre cuando se realice una técnica que genere aerosoles como por ej. toma de muestra hisopado oro-naso facial, aspirado traqueal, intubación. Solo lo usa el personal de salud. En estos procedimientos se recomienda habitación con puerta y la misma cerrada.




- **PROTECTOR OCULAR:** cuando realizamos cualquier procedimiento que estemos expuesto a fluidos para la protección de las conjuntivas




Luego de su uso siempre limpiarlos y desinfectarlos. Higiene de manos luego del retiro

- **GUANTES:** limpios (no estéril) al ingreso de la habitación y retirarlos (descartarlos) antes de salir. Se colocan luego de la sobretúnica para



colocarlos por encima del puño.

- **SOBRETÚNICA:** cubrir por debajo de la rodilla, tener puño, que cubra toda la parte posterior (atarla de forma correcta) Al entrar a la habitación y retirarla antes de salir.



- **CABELLO RECOGIDO** (el uso de gorro si hay riesgo en cabellos largos de contacto con paciente o su entorno)

SECUENCIA DE COLOCACIÓN Y RETIRADA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

COLOCACIÓN		RETIRO	
1-Sobretúnica Cubrir desde el cuello hasta rodillas y brazos Atar en la espalda (cuello y cintura)			1-Guantes Con mano enguantada tomar el otro guante por fuera y retirarlo quedando al revés. Mantenerlo en mano enguantada. Con la mano sin guante tomar por dentro el guante colocado y retirar. Descartar
2-Tapaboca Atar en el medio de la cabeza (sobre orejas) y en el cuello. Adaptar la pieza flexible a la nariz. Cubrir desde arriba de la nariz hasta abajo del mentón			2- Protector ocular Tomar por la parte lateral o bandas evitando tocar el frente
3-Protector ocular Ajustar a la cara			3- Sobretúnica Desatar cuello y cintura, llevar hacia adelante retrocediendo los brazos de forma que la parte externa quede hacia adentro.
4-Guantes Cubrir el puño de la sobretúnica			4- Tapaboca Tomar por sus tiras evitando tocar el frente. Descartarlo

- **HIGIENE Y DESINFECCIÓN:**

Realizar con toallas descartables con limpiadores desinfectantes en base amonio cuaternario o con agua y jabón y desinfectar con fricciones con alcohol 70% o dilución de cloro, dependiendo siempre de las recomendaciones del fabricante. Por lo menos 1 vez por turno o cada vez que sea necesario (ej. Termómetros)

- **MATERIAL RESPIRATORIO:**

DESCARTAR: Máscara flujo libre o controlado, nebulizadores, catéter nasal, tubuladuras.

- Frasco humidificador: lavar y desinfectarlo correctamente contemplando su totalidad (con jabón enzimático y luego desinfectarlo con dilución con hipoclorito 1000ppm)

- **HIGIENE AMBIENTAL:**

Limpiar en todos los turnos frecuentemente y en las superficies de alto contacto por lo menos 2 veces por turno, o todas las veces que sea necesario.

Contempla habitación y baños.

Se realizará con el mismo protocolo que se utiliza para las salas con precauciones de gotitas y contacto. Colocarse las EPP (Lavado de manos antes y después de colocarse los, guantes de goma, sobretúnica, tapaboca común)

Recordar que si se utilizan limpiadores desinfectantes siempre hay que realizar una detergencia con agua y jabón una vez por semana.

Se sugiere que se establezca un día fijo en el cual se aplique tanto para el personal de higiene como para el personal de enfermería.

- **El manejo de ROPA, RESIDUOS y ALIMENTACIÓN:** Se utiliza las EPP los protocolos vigentes para los pacientes que cumplen estas precauciones de aislamiento.
- **RECOMENDACIONES GENERAL:** Favorecer la ventilación. Restringir la circulación al mínimo indispensable. Mantener las puertas del pasillo cerrada.
- Evitar el uso de **CELULARES** (después hacer limpieza y desinfección con alcohol 70% y luego lavarse las manos).

MINIMIZAR LOS TRASLADOS: en caso que el paciente requiera realizar un estudio en otro sector tendrá que llevar colocado tapaboca común. El personal que realiza el traslado con la EPP para las medidas de precauciones contacto y gotitas. Se debe avisar al personal de ascensores para que tenga los implementos necesarios. Luego debe limpiar las superficies tocables del ascensor hacer énfasis en la botonera.

Siempre comunicar previamente la condición del paciente, en lo posible a última hora. Se tratara de que el mismo sea ágil y de que el paciente permanezca fuera de las áreas destinadas a estos pacientes el menor tiempo posible -

Toda superficie con la cual el paciente esté en contacto como resultado del traslado en la instalación sanitaria debe limpiarse y desinfectarse.

ACOMPañANTES: no está permitido.

El personal designado al área debe ser permanente, se le dará uniforme diariamente para la atención.